



服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に、読めるように大切に保管してください。

第 類医薬品

「モリ」シンニョウ錠

特 徴

「モリ」シンニョウ錠は、当帰、木通など成分欄記載の 14 種類の生薬で構成される和漢薬の、のみやすいエキス糖衣錠です。本剤の服用で、尿が出にくい、むくみ、下腹部の痛みなど不快な症状が改善され、膀胱カタルなど効能欄記載の腎・膀胱・泌尿器系の病気に効きめがあります。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 胃腸が弱く、下痢しやすい人。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 本人または家族がアレルギー体質の人。
 - (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (8) 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
 - (9) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	胃部不快感、食欲不振 はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、 まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧 が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2) 1 ヶ月位服用しても症状がよくならない場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください。
4. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には服用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。
下痢

効能又は効果

膀胱カタル、尿道炎、腎臓病、ネフローゼ、水腫

用法及び用量

次の量を朝夕空腹時に、水またはお湯で服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人 (16 歳以上)	3～6 錠	2 回
15 歳以下 8 歳以上	2～3 錠	

<用法及び用量に関連する注意>

小児に服用させる場合は、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分及び分量

本剤 6 錠 (2.4 g) 中、下記生薬の水製乾燥エキス 1.2 g が含まれています。

ジオウ (地黄) ……………2.5 g	サンシシ (山梔子) ……………0.75 g
トウキ (当帰) ……………2.5 g	リュウタン (竜胆) ……………0.75 g
モクツウ (木通) ……………2.5 g	ケイヒ (桂皮) ……………0.1 g
オウゴン (黄芩) ……………1.5 g	ショウキョウ (生姜) ……………0.1 g
シャゼンシ (車前子) ……………1.5 g	ダイオウ (大黃) ……………0.1 g
タクシャ (沢瀉) ……………1.5 g	マオウ (麻黄) ……………0.1 g
カンソウ (甘草) ……………0.75 g	レンギョウ (連翹) ……………0.1 g

添加物として、白糖、タルク、アラビアゴム、酸化チタン、ステアリン酸マグネシウム、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート、カルナウバロウを含有しています。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)

本剤についてのお問い合わせ先

大杉製薬株式会社 お客様相談室
〒545-0002 大阪市阿倍野区天王寺町南 1-1-2
電話 (06) 6629-0062
受付時間 10時から17時まで(土、日、祝日を除く)

大杉製薬株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2