

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に、読めるように大切に保管してください。

第 類医薬品



「モリ」ゼンチー錠

特 徴

「モリ」ゼンチー錠は、半夏、陳皮など成分欄記載の10種類の生薬で構成される和漢薬の、のみやすいエキス糖衣錠です。本剤の服用で、咳や痰（たん）、息苦しさなどの不快な症状が改善され、気管支ぜんそく、感冒の咳など効能欄記載の気管支の病気に効きめがあります。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (6) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (7) 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
- (8) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、 まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧 が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 1ヵ月位（感冒の咳に服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくなる場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください。

効能又は効果

気管支ぜんそく、気管支カタル、肋膜炎・肺結核・感冒の咳

用法及び用量

次の量を朝夕空腹時に、水またはお湯で服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人（16歳以上）	3～6錠	2 回
15歳以下8歳以上	2～3錠	

<用法及び用量に関連する注意>

小児に服用させる場合は、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分及び分量

本剤6錠(2.25g)中、下記生薬の水製乾燥エキス1.05gが含まれています。

ハング（半夏）……………1.5g	シャクヤク（芍薬）……………1g
カンソウ（甘草）……………1g	ショウキョウ（生姜）……………1g
キキョウ（桔梗）……………1g	マオウ（麻黄）……………1g
ケイヒ（桂皮）……………1g	ゴミシ（五味子）……………0.5g
サイシン（細辛）……………1g	チンピ（陳皮）……………0.5g

添加物として、白糖、タルク、アラビアゴム、酸化チタン、ステアリン酸マグネシウム、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート、カルナウバロウ、赤色3号、黄色5号を含有しています。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります）

本剤についてのお問い合わせ先

大杉製薬株式会社 お客様相談室
〒545-0002 大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2
電話（06）6629-0062
受付時間 10時から17時まで（土、日、祝日を除く）

大杉製薬株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2